



# 월간 식중독

## 노로바이러스 식중독 주의

### 노로바이러스 발생 원인



오염된 물과  
음식물의 섭취




사람 간 전파  
또는 비말감염

### 노로바이러스 증상



#### 증상

메스꺼움, 구토, 설사, 복통



#### 지속기간

1~2일 정도 발생하고 자연 치유  
\* 면역력이 약한 어린이나 노약자 등은  
구토와 설사로 인한 심한 탈수 증세로  
위험할 수 있음

## 노로바이러스 식중독



손  
씻기




익혀  
먹기




끓여  
먹기

식중독 예방 3대 요령 실천하고, 식중독 없는 새해 맞이하세요.


#### 발생지역 현황



#### 원인균 현황 (상위 6개)



#### 발생시설 현황



\* 최근 5년간('15~'19년) 1월에 발생한 식중독 현황을 분석한 자료입니다.

\* 식중독예방, 간선통, 홍보 등에 식중독 주의정보([www.foodsafetykorea.go.kr](http://www.foodsafetykorea.go.kr)) 및 예측지도([poisonmap.mfds.go.kr](http://poisonmap.mfds.go.kr))를 활용해 주시기 바랍니다.

\* 노로바이러스 예방: (1월) 군 특징 및 발생현황 → (12월) 예방법 및 손씻기 → (1월) 원인 및 증상 → (2월) 구토물 처리 및 소독액 제조



식품의약품안전처

