# 헛개나무 Japanese Raisin Tree

**분류** 갈매나무과 > 헛개나무속 > 헛개나무

**학명** *Hovenia dulcis* Thunb.

**특징** 낙엽활엽교목으로 높이 10m 정도 자란다. 꽃은 녹색으로 7월 말에 개화하며 열매는 둥글고 열매자루가 부풀어 올라 울툭불툭 살이 찌며, 10월에 성숙한다.

나무의 모습

잎

꽃·열매

## 해설 포인트

- 열매자루가 부풀어 올라 울퉁불퉁하고 꾸불꾸불한 갈색의 꽈배기 모양으로 서로 뒤엉켜 있는데 닭발 모양을 하고 있다.
- 생약명 '지구자'로 알려진 열매는 한약재로 이용하며, 민간에서는 잎, 줄기 및 열매로 차를 만들어 간에 좋은 음료로 사용한다.
- 지구자나무, 호리깨나무, 볼게나무, 닭의 발톱나무로도 불린다.
- 꽃말은 '결속'이다.

# 고로쇠나무 Painted Maple

**분류** 단풍나무과 > 단풍나무속 > 고로쇠나무

**학명** *Acer pictum* subsp. *mono* (Maxim) Ohashi

**특징** 낙엽활엽교목으로 20m 정도 자란다. 꽃은 연한 황록색으로 5월에 피며, 열매는 9~10월에 성숙한다. 잎은 단풍나무에 비해 가장자리는 톱니가 없이 밋밋하다.

## 나무의 모습

잎·열매

꽃

### 해설 포인트

- 뼈에 유익한 나무라는 뜻의 골리수(骨利樹)가 고로쇠로 변했다.
- 도선국사와 원기 회복된 고로쇠나무 수액이야기와 백제군, 상처 입은 지리산 반달곰이 고로쇠나무 물을 마시고 나았다는 이야기가 있다.
- 꽃말은 '영원한 행복' 이다.

# 닥나무 Paper Mulberry

**분류** 뽕나무과 > 닥나무속 > 닥나무

**학명** *Broussonetia kazinoki* Siebold.

**특징** 낙엽활엽관목으로 3m 정도 자란다. 꽃은 5~6월에 잎이 나올 때 암꽃은 윗부분의 잎겨드랑이에서 나오고, 수꽃은 새가지 밑 부분에 달린다. 열매는 8~10월에 적색으로 익는다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 옛날에는 '저포'라고 불리는 피륙(작물)을 짜는데 사용했다.
- 껍질은 섬유를 뽑아내어 창호지나 표구용 화선지 등 보존을 요하는 종이를 만들었으며, 이 창호지로 만든 돈을 '저화'라고 한다.
- 열매는 한방에서 '저실'이라하여 양기부족, 수종의 치료 등에 쓰였다.
- 꽃말은 '당신에게 부를 드려요.'이다.

# 주목 Japanese Yew

**분류** 주목과 > 주목속 > 주목

**학명** *Taxus cuspidata* Siebold. & Zucc.

**특징** 상록침엽교목으로 17~20m 정도 자란다. 꽃은 4월에 피며 암수딴그루로 연노랑색의 수꽃은 6개 비늘조각, 연녹색의 암꽃은 10개 비늘조각으로 싸여 있다. 열매는 8~9월에 동그랗고 빨갛게 익는다.

## 나무의 모습

수피

열매

### 해설 포인트

- 주목(朱木)은 '붉은 나무'라는 뜻으로 나무의 속 색깔이 붉은 색을 띠고 있어서 붙여진 이름이다.
- 항암물질인 Taxol성분이 잎과 껍질, 종자의 씨눈에 함유되어 있다.
- '살아 천 년, 죽어 천 년의 나무'라고 하는데 오래 살 수 있고 목재로 쓰인 뒤에도 잘 썩지 않기 때문이다.
- 꽃말은 '명예', '고상함', '비애'이다.

# 상수리나무 Sawtooth Oak

**분류** 참나무과 > 참나무속 > 상수리나무

**학명** *Quercus acutissima* Carruth.

**특징** 낙엽활엽교목으로 높이 25m 정도 자란다. 꽃은 5월에 피며 수꽃차례는 새가지 밑 부분의 잎겨드랑이에서 처지고 암꽃차례는 윗부분의 잎겨드랑이에서 곧추나와 달린다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 잎은 밤나무와 비슷하지만, 거치 끝에 엽록체가 없어 희게 보이므로 구분된다.
- 참나무 종류의 열매를 '도토리'라고 부르지만 상수리나무 열매는 '상수리'라고 부른다.
- 열매는 가루로 만들어 떡, 묵, 상수리밥을 지어 먹었다.
- 꽃말은 '번영'이다.

# 오동나무 Paulownia

**분류** 현삼과 > 오동나무속 > 오동나무

**학명** *Paulownia coreana* Uyeki.

**특징** 낙엽활엽교목으로 높이 20m 정도 자란다. 꽃은 5~6월에 가지 끝에 자주색으로 피지만 목 부분은 황색이다. 잎은 보통 오각형으로 지름이 12~30㎝으로 크다.

## 나무의 모습

잎

꽃

### 해설 포인트

- 습기에 강하고 불에 잘 타지 않아 전통 장롱을 제작하는데 많이 쓰였다.
- 예전에는 딸을 낳으면 오동나무를 심어 시집 보낼 때 장롱을 만들어 보냈다고 하여 '딸나무' 라고도 했다.
- 소리 전달이 잘 되어 거문고나 가야금 등 악기에도 사용 되었다.
- 모두 약재로 쓰이지만 특히 잎은 살충효과가 뛰어나다고 한다.
- 꽃말은 '고상하다' 이다.

# 문화식물원

영춘화
쥐똥나무
명자나무
진달래
박태기나무

문화식물원은 우리 한시, 민요, 동요, 가요, 속담, 소설 등에 등장하는 식물을 모은 '문학식물원', 설화나 민화에 등장하는 식물을 모은 '이야기숲', 학교 교과서에 등장하는 식물을 모은 '어린이학습원'으로 우리 문화와 관련된 식물을 수집 전시한 원입니다.

# 영춘화 Winter Jasmine

**분류** 물푸레나무과 > 영춘화속 > 영춘화

**학명** *Jasminum nudiflorum* Lindl.

**특징** 낙엽관목으로 2m 정도 자란다. 잎은 마주나고 홀수 깃꼴겹입이다. 잎보다 먼저 노란 꽃이 각 마디에 마주 핀다. 녹색줄기는 네모지고, 가지가 옆으로 퍼져서 땅에 닿은 곳에서 뿌리가 내린다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 봄을 맞이하는 꽃이라는 뜻에서 영춘화(迎春化)라고 한다.
- 개나리와는 색과 피는 시기 그리고 줄기의 뻗음이 비슷하지만 전혀 다른 식물이다. 꽃잎 수가 개나리 4장, 영춘화 6장으로 다르다.
- 열매는 장과지만 우리나라에서는 맺히지 않는다.
- 줄기가 초록색이고 노란 꽃이 일찍 피므로 즐겨 가꾸고 있다.

# 쥐똥나무 Privet

**분류** 물푸레나무과 > 쥐똥나무속 > 쥐똥나무

**학명** *Ligustrum obtusifolium* Siebold & Zucc.

**특징** 낙엽활엽관목으로 2~4m 정도 자란다. 꽃은 5~6월경에 가지 끝에서 총상꽃차례를 이루며 잔털이 많다. 10월경 둥근 핵과 열매는 검은색으로 익고 약간 단단하다.

나무의 모습

꽃·잎

열매

## 해설 포인트

- 검게 익은 열매가 쥐똥 같이 생겼다하여 쥐똥나무라 한다.
- 가지치기를 통한 수형 조절이 용이하여 울타리용으로 많이 심는다.
- 과실을 수랍과(水蠟果)라 하여 약용하며, 햇볕에 말려 달여서 복용하면 강장, 지혈의 효능이 있다.
- 꽃말은 '강인한 마음' 이다.

# 명자나무 Flowering Quince

**분류** 장미과 > 명자나무속 > 명자나무

**학명** *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai.

**특징** 낙엽활엽관목으로 1~2m 정도 자란다. 꽃은 단성화로 수꽃의 씨방은 여위고 암꽃의 씨방은 크게 자란다. 구형, 타원형 열매는 누렇게 익으면 신맛이 나는 향기가 있다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 이른 봄에 은은하고 청초한 느낌을 주어 '아가씨나무' 라고도 한다.
- 전정가위로 잘라내도 금방 새가지를 뻗어 생울타리로 심기 좋으며 가지가 변한 가시가 있어 화단의 경계나 출입구 좌우에 심는다.
- 약의 효능은 모과와 거의 비슷하다.
- 꽃말은 '신뢰', '수줍음' 이다.

# 진달래 Korean rhododendron

**분류** 진달래과 > 진달래속 > 진달래

**학명** *Rhododendron mucronulatum* Turcz.

**특징** 낙엽활엽관목으로 2~3m 정도 자란다. 잎보다 먼저 꽃이 피며 가지 끝에 2~5개 모여 달린다. 1.5㎝ 원기둥 모양의 열매는 11월에 성숙한다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 먹을 수 있는 진짜 꽃이란 의미로 '참꽃' 이라고도 하고, 진달래의 붉은빛이 두견새가 밤새 울어 피를 토한 것이라는 전설 때문에 '두견화' 라고도 한다.
- 김소월의 시 『진달래꽃』 "영변에 약산/ 진달래꽃/ 아름 따다 가실 길에 뿌리오리다."
- 꽃말은 '절제', '청렴', '사랑의 즐거움' 이다.

# 박태기나무 Chinese Redbud

**분류** 콩과 > 박태기나무속 > 박태기나무

**학명** *Cercis chinensis* Bunge.

**특징** 낙엽활엽관목으로 3~5m 정도 자란다. 잎보다 먼저 홍자색 꽃이 모여 핀다. 심장형 잎은 두껍고 5개로 갈라지는 맥이 발달했다. 7~12㎝의 꼬투리열매가 열린다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 꽃이 많고 꽃자루가 짧아 꽃봉오리가 달려있는 모양이 마치 밥알, 즉 '밥티기' 닮았다고 하여 박태기라 이름 붙였다는 설이 있다.
- 16세기 말 화가 카스토르 듀란트가 예수를 로마 병사에게 팔아넘긴 유다가 목매 죽는 장면을 그린 판화에 나오는 나무가 서양박태기나무이다. 이후 이 나무를 '유다트리(Judas tree)'라 부르게 되었다.
- 꽃말은 '우정', '의혹'이다.

# 희귀자생 비교식물원 지구

# 해안사구원

낙우송
순비기나무
수양버들
섬괴불나무
섬댕강나무
소사나무

인천의 152개 섬에서 볼 수 있는 모래언덕을 재현하고 순비기나무, 소사나무 등의 사라져가는 해안사구식물을 전시하여 해안사구식물의 아름다움을 알리고 보존하고자 하는 전시원입니다.

# 낙우송 Deciduous Cypress

- 분류 낙우송과 > 낙우송속 > 낙우송
- 학명 *Taxodium distichum* (L.) Rich.
- 특징 낙엽침엽교목으로 50m 정도 자란다. 잎은 긴가지에서는 나선상으로 달리며, 짧은가지에서는 2줄로 어긋나게 달린다. 암수한그루로 4~5월에 개화하고 구형 열매는 9월에 익는다.

나무의 모습

잎

기근

## 해설 포인트

- 낙우송은 약간 납작하고 긴 선형(線形)의 잎이 양옆으로 나란히 붙어 있어서 마치 새의 날개모양인데, 가을에 낙엽이 질 때 날개처럼 달린 잎이 전체로 떨어진다고 하여 '낙우송' 이다.
- '기근' 은 낙우송 근처에 땅 위로 나와 있는 돌기로 산소를 공급해 주는 공기뿌리이다.
- 꽃말은 '남을 위한 삶' 이다.

# 순비기나무 Beach Vitex

- 분류 마편초과 > 순비기나무속 > 순비기나무
- 학명 *Vitex rotundifolia* L.f.
- 특징 낙엽활엽관목으로 80㎝ 정도 자란다. 꽃부리는 푸른 보라색으로 7~8월에 개화하고, 잎은 마주나기로 두꺼우며 표면에 잔털이 많고 가장자리가 밋밋하다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 인천에 자생하는 식물로써 바닷가 모래 땅속에 뿌리를 뻗어서 다른 싹과 뿌리를 내어 모래를 고정해주는 효과가 있다.
- 해녀들이 물속에서 숨을 참고 있다가 물 위로 올라오면서 내는 숨소리를 '숨비소리' 혹은 '숨비기소리'라고 한다.
- 열매는 해녀들의 만성 두통에 치료제로 애용된다.
- 꽃말은 '그리움', '바다를 향한 그리움'이다.

# 수양버들 Babylon Willow

- 분류 버드나무과 > 버드나무속 > 수양버들
- 학명 *Salix babylonica* L.
- 특징 낙엽활엽교목으로 15~20m 정도 자란다. 잎은 어긋나고 가장자리에 잔톱니가 있거나 밋밋하다. 4월에 잎과 같이 황록색 꽃이 핀다. 가지가 밑으로 처지며 일년생가지가 적갈색이다. 잎의 모양과 수형이 능수버들과 비슷하다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 중국 고유종으로 수양버들의 '수양'은 원래 수(隋)나라의 양제(煬帝)에서 유래한 이름이라고 한다.
- 가지가 가늘고 실같이 늘어지므로 아름다운 여인에 비유되기도 한다.
- 봄철 솜털처럼 흩날리는 씨가 호흡기 및 피부질환을 일으키기도 한다.
- 꽃말은 '슬픔', '평화'이다.

# 섬괴불나무 Ulleungdo Honersuckle

- 분 류 인동과 > 인동속 > 섬괴불나무
- 학 명 *Lonicera insularis* Nakai
- 특 징 낙엽활엽관목으로 5~6m 정도 자란다. 꽃은 5~6월에 잎겨드랑이에 2개의 꽃이 달리고, 꽃부리는 흰색에서 노란색으로 변한다. 열매는 붉은색으로 7~8월에 성숙한다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 우리나라에서는 울릉도에 자생하고 있다.
- 백색 꽃이 황색으로 지는 모습이 우아하고, 꿀이 많아 밀원 식물로도 이용한다.
- 여름철에 무르익는 열매가 아름답고, 조경수로 군식하여 심어도 좋다.
- 자생지가 제한되어 있어 현지내 개체보호와 현지외보존도 필요한 수종이다.

# 섬댕강나무 Insular Abelia

- 분류 인동과 > 댕강나무속 > 섬댕강나무
- 학명 *Abelia coreana* var. *insularis* (Nakai) W.T.Lee & W.K.Paik
- 특징 낙엽활엽관목으로 80㎝ 정도 자란다. 마주난 2개의 잎자루가 원줄기를 완전히 둘러싼다. 5월에 연한 황색 꽃이 가지 끝에 핀다. 열매는 둥글고 9월에 익는다.

나무의 모습

### 해설 포인트

- 댕강나무속은 석회암 지대의 대표적인 식생이다.
- 도동의 섬개야광나무, 섬댕강나무 군락이 천연기념물 제 51호로 지정되어있는 특산 식물이다.
- 원줄기에 6줄의 홈이 있으며 가지는 붉은 빛이 돌고 털이 없다.
- 꽃말은 '평안함', '소녀의 꿈' 이다.

# 소사나무 Korean Hornbeam

**분류** 자작나무과 > 서어나무속 > 소사나무

**학명** *Carpinus turczaninowii* Hance

**특징** 낙엽활엽관목으로 10m 정도 자란다. 꽃은 암수한그루로 4~5월에 피며 수꽃차례는 아래로 처진다. 반달갈형 열매는 9~10월에 성숙한다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- '작은 서어나무'란 뜻으로 '소서목'이라 불리다가 소사나무로 변했다고 한다.
- 강화도 마니산의 단군 제사 터에 심어져 있는 소사나무가 천연기념물 제502호로 지정되어있다.
- 메마름과 소금기에 강하며, 줄기가 잘려져도 새싹이 잘 나오는 등 척박한 조건에 잘 적응하는 나무로 분재나무로 널리 이용된다.
- 꽃말은 '믿을 수 있는 사람'이다.

# 침엽수원

개잎갈나무
잣나무
전나무
종비나무
측백나무
화백

인천 도서해안 및 내륙에 분포하는 자생 식물 중 낙우송과, 소나무과, 은행나무과, 주목과, 측백나무과 등의 침엽수를 모아 사계절 푸른 수목의 아름다움을 감상할 수 있도록 전시한 원입니다.

# 개잎갈나무 Deodar

**분류** 소나무과 > 개잎갈나무속 > 개잎갈나무

**학명** *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don

**특징** 상록침엽교목으로 30m 정도 자란다. 잎은 짙은 녹색으로 모여 나고, 암수 한그루로 꽃은 10~11월에 핀다. 열매는 다음해 9~12월에 길이 7~10㎝, 지름 6㎝ 정도로 성숙한다.

나무의 모습

수꽃

열매

## 해설 포인트

- 원산지는 히말라야로, '히말라야시다, 히말라야삼나무'라고도 부른다. 우리나라에서는 광주, 동대구 등에서 가로수로 심어져 있는 것을 볼 수 있다.
- 히말라야에서는 다산의 힘이 있다고 믿어 개잎갈나무 아래에서 양을 재물로 바치고 주술을 외운다고 한다.
- 꽃말은 '보고 싶은 아버지'이다.

# 잣나무 Nut Pine

- 분류 소나무과 > 소나무속 > 잣나무
- 학명 *Pinus koraiensis* Siebold & Zucc.
- 특징 상록침엽교목으로 높이 30m 정도 자란다. 잎은 침엽으로 5개씩 나는데 양면에 백색 기공조선이 있다. 암꽃은 녹황색, 수꽃은 루비와 같은 붉은색이다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 우리나라 중부 이남의 해발 1,000m이상 혹은 지리산 이북의 높은 산지에서 자생하는 수종이다.
- 잣나무는 바늘 잎을 5개 가진 5엽송, 소나무는 2엽송, 백송과 리기다나무는 3엽송으로 구분된다.
- '잣'은 잣나무의 열매로 한방에서는 '해송자(海松子)'라하여 동맥 경화증이나 변비에 효과가 있으며, 신라 사신들이 중국에 갈 때 잣을 선물로 가져갔다고 한다.
- 꽃말은 '만족'이다.

# 전나무 Needle Fir

- 분류 소나무과 > 전나무속 > 전나무
- 학명 *Abies holophylla* Maxim.
- 특징 상록침엽교목. 암수한그루로 4월에 황록색 꽃이 핀다. 수꽃차례는 원통형이고 암꽃차례는 2~3개씩 모여 달린다. 달걀형 또는 원통형 구과 열매는 끝이 뾰족하거나 둔하다.

나무의 모습

잎

수피

## 해설 포인트

- 〈훈몽자회〉, 〈왜어유해〉, 〈방언유석〉 등 옛 문헌에는 젓나무로 나오는데, 어린 열매에서 흰 젓이 나와서 젓나무라고 한다.
- 오대산 월정사 입구의 전나무 숲이 유명하다. 경북 청도 운문사, 전북 부안 내소사 등 큰 사찰에 자라는 전나무는 절을 고쳐 지을 때 기둥으로 쓰기 위하여 일부러 심은 것이다.
- 꽃말은 '고상함' 이다.

# 종비나무 Korean Spruce

- 분류 소나무과 > 가문비나무속 > 종비나무
- 학명 *Picea koraiensis* Nakai
- 특징 상록침엽교목으로 높이는 25m 정도 자란다. 선형 잎은 길이 1.2~2㎝이다. 꽃은 5월에 개화하고, 10월에 익는 열매는 다갈색 또는 연한 갈색으로 끝이 아래로 처진다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 우리나라에서는 북부지방의 높은 산지에서 자라는 상록 바늘잎 큰키나무로 러시아 및 중국에도 분포한다.
- 열매는 9~10월에 익는데 약 30년생부터 열매를 맺는다.
- 수형이 고깔 모양으로 관상용으로 적합하다.

# 측백나무 Chinese Arborvitae

- 분 류 측백나무과 > 눈측백속 > 측백나무
- 학 명 *Thuja orientalis* L.
- 특 징 상록침엽교목으로 25m 정도 자란다. 잎은 비늘모양이며 뾰족하고 뒷면에는 작은 줄이 있다. 나무껍질은 세로로 갈라진다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 측백이란 잎이 납작하고 옆으로 자라기 때문에 붙여진 이름이라고 〈본초강목〉에서 밝히고 있다.
- 중국에서만 자라는 나무로 알려져 있었으나, 대구 도동 측백나무 숲이 발견되어 식물 분포학상 학술적 가치를 인정받아 1962년도에 천연기념물 제1호로 지정되었다.
- 꽃말은 '건강' 이다.

# 화백나무 Sawara Cypress

- 분류 측백나무과 > 편백속 > 화백나무
- 학명 *Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl.
- 특징 상록침엽교목으로 50m 정도 자란다. 잎 뒷면에는 W자의 백색 기공조선이 있고 잎 끝이 뾰족하다. 암수딴그루로서 꽃은 4월에 개화하고 암꽃은 작은 별모양을 하고 있다.

## 나무의 모습

잎

열매(실화백)

## 해설 포인트

- 편백나무와 비슷하나 열매가 조금 작고 잎 뒷면에 W자의 무늬가 있다. 편백나무가 따뜻한 지방에서 잘 자란다면 화백은 강원도와 같은 추운 지방에서 잘 자란다.
- 유사종으로 가지가 가늘게 실처럼 뻗어 아래로 처지는 실화백이 있다.
- 꽃말은 '변하지 않는 사랑' 이다.

# 활엽수원

갈매나무
까마귀베개
대팻집나무
까마귀밥나무
합다리나무
노린재나무
감태나무
비목나무
풍게나무
매화말발도리
길마가지나무
올괴불나무
물박달나무
박달나무

인천 도서해안 및 내륙에 분포하는 자생 식물 중 참나무과, 자작나무과, 뽕나무과, 가래나무과 등의 낙엽활엽수를 모아 여름의 신록과 단풍 그리고 낙엽을 감상할 수 있도록 전시한 원입니다.

# 갈매나무 Davurian Buckthorn

- 분류 갈매나무과 > 갈매나무속 > 갈매나무
- 학명 *Rhamnus davurica* Pall.
- 특징 낙엽활엽관목으로 5m 정도 자란다. 잎은 마주나기하며 긴 타원형으로 가장자리에 둔한 잔톱니가 있다. 꽃은 5월에 황록색으로 잎겨드랑이에 1~2개씩 달린다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- '갈매'는 짙은 초록색을 뜻하는 순수 우리말로 한여름에 나뭇잎이 반질거리며 진한 초록색을 띠어 붙여진 이름으로 추정된다.
- 농업 백과산전 '임원경제지'에 의하면 '늙은 갈매나무 껍질로 염색을 하면 진한 초록색을 얻을 수 있다'고 했다.
- 꽃말은 '고향생각'이다.

# 까마귀베개 Crow's Pillow

- 분류 갈매나무과 > 까마귀베개속 > 까마귀베개
- 학명 *Rhamnella franguloides* (Maxim.) Weberb.
- 특징 낙엽활엽관목으로 7m 정도 자란다. 잎은 어긋나기하고 긴 타원형이며 가장자리에 잔톱니가 있다. 꽃은 5~7월에 개화하고 열매는 8~10월 노란색, 붉은색, 검은색 순서로 익는다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 푸대추나무, 가마귀마개, 가마귀제개, 헛갈매나무라고도 한다.
- 열매가 아름다워 관상가치가 높아 원예 및 조경용으로 사용한다.
- 본초명은 난엽묘유(卵葉猫乳)라 한다.
- 줄기는 기력감퇴증상을 개선시키고, 뿌리는 옴과 악창에 효과가 있어 약용한다.

# 대팻집나무 Macropoda

- 분류 감탕나무과 > 감탕나무속 > 대팻집나무
- 학명 *Ilex macropoda* Miq.
- 특징 낙엽활엽교목으로 15m 정도 자란다. 잎은 어긋나지만 짧은가지에선 모여 나고 톱니가 드문드문 발달한다. 꽃은 5~6월에 짧은가지 위에 녹백색으로 달린다.

나무의 모습

짧은가지

꽃·열매

## 해설 포인트

- 국내 자생하는 감탕나무속 식물 중에서 유일하게 낙엽성이며, 줄기에 짧은가지가 발달했다.
- 국명은 목재가 단단하고 치밀해 '대팻집을 만드는 데 사용하는 나무'라는 뜻에서 유래했다.
- 어린순은 식용. 가로수. 조경재료로 개발가치가 있는 수종이다.
- 꽃말은 '가정의 행복'이다.

# 까마귀밥나무 Japanese Currant

**분류** 까치밥나무과 > 까치밥나무속 > 까마귀밥나무

**학명** *Ribes fasciculatum* var. *chinense* Maxim.

**특징** 낙엽활엽관목으로 1~1.5m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 둥글고 3~5개로 갈라지며 뭉툭한 톱니가 있다. 꽃은 4~5월에 잎겨드랑이에 2~5개씩 연한 노란색으로 핀다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 까마귀밥나무가 속한 까치밥나무속은 본래 범의귀과에 포함시켜 왔으나, 열매의 DNA 분석을 통해 독립된 과로 분류되었다.
- 까마귀밥나무는 줄기에 가시가 없고 수꽃과 암꽃이 짧은가지에 모여서 피는 특징이 있어, 같은 속에 있는 다른 식물들과는 구분된다.
- 본초명 '등롱과(燈籠果)' 라고 하며 해열, 생리불순 등에 효과가 있다.
- 꽃말은 '예상' 이다.

# 합다리나무 Oldham's Meliosma

- 분류 나도밤나무과 > 나도밤나무속 > 합다리나무
- 학명 *Meliosma oldhamii* Maxim.
- 특징 낙엽활엽소교목으로 10m 정도 자란다. 잎은 어긋나기하고 뒷면 맥 위에 털이 많다. 꽃은 백색으로 6월에 피며, 열매는 9~10월에 둥글고 붉게 성숙한다.

## 나무의 모습

잎·새순

꽃

### 해설 포인트

- 학의 다리와 같이 생겼다고해서 붙여진 이름이라고 한다. 새순을 채취하는 사람들은 학의 머리처럼 잎이 머리를 숙이고 있어 찾기가 쉽다.
- 잎 모양을 보면 합다리나무는 겹잎인 반면 같은 속의 나도밤나무는 단엽으로 전혀 다른 나무로 보이지만 꽃의 구조는 거의 동일하다.
- 어린순은 식용하며, 목재는 세공재로 사용한다.

# 노린재나무 Asian Sweetleaf

**분류** 노린재나무과 > 노린재나무속 > 노린재나무

**학명** *Symplocos chinensis* f. *pilosa* (Nakai) Ohwi

**특징** 낙엽활엽관목으로 1~3m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 타원형 또는 거꿀달걀형으로 가장자리에 긴 톱니가 있다. 꽃은 5~6월 중순에 새가지 끝에 흰색으로 달린다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 가을에 단풍이 든 잎을 태우면 노란색 재를 남긴다 하여 '노린재나무'라는 이름이 붙여졌다.
- 흰 꽃이 만발하면 나무 전체가 눈에 덮인 것 같다. 가을에 하늘처럼 푸르게 익는 청람색 열매 또한 일품이다.
- 목재는 연장의 자루나 자, 지팡이 등의 재료로 쓰인다.
- 꽃말은 '동의'이다.

# 감태나무 Greyblue Spicebush

- 분류 녹나무과 > 생강나무속 > 감태나무
- 학명 *Lindera glsuca* (Siebold & Zucc.) Blume
- 특징 낙엽활엽관목으로 5m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 두껍고 윤채가 있다. 암수딴그루로 4~5월에 꽃이 피는데 주변에 수그루가 없을 경우 무배생식도 한다고 한다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 잎의 표면에 광택이 있으며 주홍색 또는 갈색으로 단풍이 드는데 이듬해 봄 새로운 잎이 나오기 전까지 마른 잎이 달려있다.
- 감태나무를 달여 차로 마시면 뼈가 무쇠처럼 튼튼해진다고 한다.
- 감태나무의 정유 성분은 잎, 가지, 열매, 뿌리에 모두 들어있다.
- 줄기는 지팡이로 사용되며 연수목이라고 불리며 비싸게 거래된다.
- 백동백나무, 간자목이라고도 불린다.

# 비목나무 Red-fruit Spicebush

- **분류** 녹나무과 > 생강나무속 > 비목나무
- **학명** *Lindera erythrocarpa* Makino
- **특징** 낙엽활엽관목으로 15m까지도 자란다. 잎은 어긋나기로 두껍고 타원형이며 가장자리가 밋밋하다. 암수딴그루의 꽃은 4~5월에 잎보다 먼저 피고 노란색이다.

나무의 모습

꽃

잎눈·꽃눈

## 해설 포인트

- 유래가 정확하지는 않지만 비석을 대신할 만큼 단단한 나무라는 의미라는 설이 있다. 가곡 '비목'은 비석 대신 전장에서 급히 세운 나무를 의미하여 비목나무는 '비목'의 어원으로 통하고 있다.
- 줄기가 보얗다고 보얀목, 백목이라고도 한다.
- 열매와 잎은 약재로 해열, 심장 기능저하 회복으로 사용하고 있다.
- 꽃말은 '아픈 기억'이다.

# 비술나무 Siberian Elm

- 분류 느릅나무과 > 느릅나무속 > 비술나무
- 학명 *Ulmus pumila* L.
- 특징 낙엽활엽교목으로 15m까지 자란다. 잎은 어긋나고 타원형, 장타원형으로 가장자리에 톱니가 있다. 꽃은 3월에 잎보다 먼저 피고 열매는 거꿀달걀모양으로 끝이 오목하다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 느릅나무 계통 중에 생육속도가 가장 빠른 수종이다.
- 목재는 변재가 백색, 심재는 암홍색으로 질이 좋고, 무겁고 탄력성이 좋아 갈라지지 않는다. 건축재, 기구재, 선박재 등으로 이용된다.
- 나무껍질과 뿌리껍질을 유백피(楡白皮)라 부르며 이뇨, 종기 등에 사용한다.
- 어린잎과 껍질은 식용으로, 열매는 사료용으로 쓰인다.
- 꽃말은 '위엄' 이다.

# 참느릅나무 Korean Autumn Elm

**분류** 느릅나무과 > 느릅나무속 > 참느릅나무

**학명** *Ulmus parvifolia* Jacq.

**특징** 낙엽활엽교목으로 10~15m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 두꺼우며 표면은 윤채가 나고 측맥은 10~20쌍이다. 꽃은 9월에 잎겨드랑이에 모여 피고 열매는 9~11월에 익는다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 느릅나무에 비해 잎이 작고 가장자리는 외톱니 모양이며 잎 양면에 털이 없다.
- 유사종으로는 둥근참느릅나무, 좀참느릅나무가 있다.
- 어린잎은 식용하고 껍질은 약용하며 관상수 혹은 가로수로 심는다..
- 꽃말은 '위엄', '존경', '관용' 이다.

# 풍게나무 Caudate-leaf Hackberry

- 분류 느릅나무과 > 팽나무속 > 풍게나무
- 학명 *Celtis jessoensis* Koidz.
- 특징 낙엽활엽교목으로 15m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 타원형 또는 장타원형이고 가장자리에 예리한 거치가 있다. 꽃은 5월에 잎겨드랑이에 핀다. 열매는 둥글고 검게 익는다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 단감주나무라고도 하며 열매는 식용한다.
- 건조한 곳에서는 생장이 좋지 않으나 공해에 강하다.
- 목재가 튼튼하여 가구재, 건축재, 신탄재로 이용, 조림수로도 쓰인다.
- 어린 나무는 생장속도가 빠르나 점점 완만해져 둥근 수형을 이룬다.

# 매화말발도리 a Deutzia

- 분류 범의귀과 > 말발도리속 > 매화말발도리
- 학명 *Deutzia uniflora* Shirai
- 특징 낙엽활엽관목으로 1m 정도 자란다. 잎은 장타원형 또는 넓은 피침형이며 불규칙한 잔톱니가 있다. 꽃은 4~6월초에 전년도 가지의 측면에 1~3개씩 달린다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 한국 특산의 암생식물이다. 가지가 꺾일 때 나는 소리를 따서 '댕강목' 이라고도 한다.
- 매화 대신 정원수로 많이 식재하며 꽃이 아름다워 봄에 야생꽃꽂이 소재로 유망하다.
- 바위틈에서 자라며 내한성과 내음성, 내건성이 강하다.
- 유사종으로 바위말발도리, 지리말발도리, 해남말발도리가 있다.
- 꽃말은 '애교' 이다.

# 길마가지나무 Early-blooming Ivory Honeysuckle

- 분류 인동과 > 인동속 > 길마가지나무
- 학명 *Lonicera harai* Makino
- 특징 낙엽활엽관목으로 2~3m 정도 자란다. 연한노란색의 꽃은 좌우대칭을 이루고 열매는 장과로 5월경에 붉게 익는다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- '조선산림수목감요(1923)' 에서는 길마가지나무를 전남 방언에서 유래한 '숫명다래나무' 로 기록하고 있다. 근대 식물분류학이 도입 되기 전부터 불렸던 민간 이름이다.
- 길마는 짐을 싣거나 수레를 끌기 위하여 소나 말 등에 얹는 안장을 뜻하고, 길마가지는 길마에 몸을 이루는 말굽 모양의 나뭇가지라고 한다 .
- 꽃말은 '소박함' 이다.

# 올괴불나무 Early-blooming Honeysuckie

- **분류** 인동과 > 인동속 > 올괴불나무
- **학명** *Lonicera praeflorens* Batalin
- **특징** 낙엽활엽관목으로 1~2m 정도 자란다. 마주나는 잎은 양면에 분백색이 돌고 표면에 털이 있다. 꽃이 잎보다 먼저 피고, 전년 가지 끝에 2개씩 달린다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 눈이 녹으면서 가지 끝에 연분홍색의 꽃이 피어 아름답고 초여름에 익는 홍색 열매는 매혹적이며 식용 가능하다.
- 국명은 '일찍(올) 꽃이 피는 괴불나무' 라는 뜻이며, 국내 자생 낙엽활엽수들 중 봄에 가장 일찍 꽃이 피는 축에 속한다.
- 꽃말은 '사랑의 희열' 이다.

# 물박달나무 Black Birch

- 분류 자작나무과 > 자작나무속 > 물박달나무
- 학명 *Betula davurica* Pall.
- 특징 낙엽활엽교목으로 높이 20m 정도로 자란다. 암수한그루의 꽃은 4~5월에 피며 나무껍질은 회백색의 얇은 조각으로 불규칙하게 벗겨지고 물에 젖어도 불에 잘 탄다.

## 나무의 모습

암꽃

열매

### 해설 포인트

- 물박달나무는 '수액을 받아 마실 수 있는 박달나무'라 해서 그 이름이 유래되었다고 한다.
- 껍질은 비에 젖거나 물에 흠뻑 젖어도 잘 타기 때문에 불소기개로 사용되어 산악인이나 군인들이 많이 이용했다고 한다.
- 우리나라 백두대간을 중심으로 추운지역에 많이 분포하고 있다.
- 꽃말은 '당신을 기다립니다.' 이다.

# 박달나무 Schmidt Birch

**분류** 자작나무과 > 자작나무속 > 박달나무

**학명** *Betula schmidtii* Regel

**특징** 낙엽활엽교목으로 30m 정도 자란다. 암수한그루로 5월에 꽃이 핀다. 잎은 어긋나기며 가장자리에 잔톱니가 있다. 열매는 소견과로서 위로 향하여 달리며 9월에 익는다.

나무의 모습

암꽃

열매

## 해설 포인트

- 동아시아 지역에 폭넓게 분포하며, 수피가 검고, 목재가 단단하면서 무겁고, 생장이 느린 면에서 자작나무속에서 독특한 분류군이다.
- 다듬이 방망이나 홍두깨, 방아와 절구공이 등을 만들고 물에 가라앉을 정도로 무거워 수레바퀴나 바퀴살을 만들기도 한다.
- 고조선 때부터 활을 단궁, 맥궁, 낙랑단궁이라 부르며 사냥활로 사용했다는 기록이 남아 있다.
- 꽃말은 '견고'이다.

# 희귀자생원

깽깽이풀
복수초
뻐꾹나리
얼레지
윤판나물
족도리풀

희귀자생원은 우리나라에 자생하지만 점점 그 모습을 찾아보기 힘든 식물을 보존하기 위한 원입니다. 주로 이른 봄에 꽃이 피고 청정지역에서 볼 수 있는 깽깽이풀, 복수초, 얼레지 등을 볼 수 있습니다.

# 깽깽이풀 Chinese Twinleaf

- **분류** 매자나무과 > 깽깽이풀속 > 깽깽이풀
- **학명** *Jeffersonia dubia* (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & S.Moore
- **특징** 여러해살이풀로 20~30㎝ 정도 자란다. 4~5월 꽃이 피며 꽃대가 잎보다 먼저 나온다. 원뿌리는 단단하다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 연한 보랏빛 꽃이 유난히 예쁘게 피는 깽깽이풀은 농사일이 바쁠 때 피어나, 사람들은 바쁜데 일 안하고 깽깽이나 켜는 것 같아 지어 졌다.
- 환경부에서 지정한 멸종위기종으로 자생지 훼손이 쉽게 일어나 현지내외 보전이 필요한 수종이다.
- 열을 내리고 해독작용이 있어 예로부터 한약재로 사용하여 왔다.
- 꽃말은 '설원의 불심', '안심하세요.' 이다.

# 복수초 Amur Adonis

- 분류 미나리아재비과 > 복수초속 > 복수초
- 학명 *Adonis amurensis* Regel & Radde
- 특징 여러해살이풀로 10~30㎝ 정도 자란다. 2~4월까지 꽃이 피며 꽃이 진 후에는 30~40㎝까지 자란다. 잎은 깃꼴로 갈라지는 겹잎이다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 복(福)과 장수(長壽) 또는 부유와 행복을 상징하며, 봄에 볼 수 있는 대표적 꽃이다.
- 눈과 얼음 사이를 뚫고 꽃이 피어나므로 '얼음새꽃', '눈새기꽃'이라고도 부른다.
- 북해도에는 '아니누족'이란 원주민은 복수초를 '크론'이라고 부르며 '아름다운 여신 크론'의 전설이 전해오고 있다.
- 꽃말은 동양에서는 '영원한 행복', 서양에서는 '슬픈 추억'이다.

# 뻐꾹나리 Toad Lily

- 분류 백합과 > 뻐꾹나리속 > 뻐꾹나리
- 학명 *Tricyrtis macropoda* Miq.
- 특징 여러해살이풀로 30~100㎝ 정도 자란다. 7월에 피는 백색 꽃은 자주색의 반점이 있으며 하부에 황색 반점이 있는 것도 있다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 꽃덮이에 있는 분홍색의 얼룩이 뻐꾹새의 목에 있는 무늬와 닮았으며 나리종류와 비슷하다는 뜻에서 유래 되었다.
- "조선식물향명집1937년"에는 '뻑꾹나리', "조선식물명집1949년"에는 '뻐꾹나리' 로 표기가 변해서 기록되었다.
- 꽃말은 '영원히 당신의 것', '당당' 이다.

# 얼레지 Dog-tooth Violet

- 분류 백합과 > 얼레지속 > 얼레지
- 학명 *Erythronium japonicum* (Balrer) Decne.
- 특징 숙근성 여러해살이풀로 25㎝ 정도 자란다. 잎은 약간 주름이 지고 표면은 녹색 바탕에 자주색 무늬가 있다. 꽃은 4월에 피며 자주색 꽃잎은 뒤로 말리며 안쪽 밑부분에 더욱 짙은 W자형의 무늬가 있다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 깊은 산속의 낙엽수림 하부의 비옥한 땅에서 자란다.
- 개미 유충 냄새와 흡사한 검은색의 씨앗을 개미들이 자신들의 알인 줄 알고 옮겨 날라 씨의 발아를 돕는다.
- 초가을에 비늘줄기를 캐서 쪄먹거나 이질 구토 치료에 쓰고 강장제로도 사용한다.
- 꽃말은 '질투' 이다.

# 윤판나물 Korean Disporum

- 분류 백합과 > 애기나리속 > 윤판나물
- 학명 *Disporum uniflorum* Baker
- 특징 여러해살이풀로 30~60㎝ 정도 자란다. 꽃은 4~6월에 가지 끝에 1~3개가 밑을 향해 달리며 길이 2㎝ 정도로 황색이다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 보탁초(寶鐸草), 대애기나리, 대애기나물, 큰가지애기나리, 금윤판나물 이라고도 한다.
- 잎의 모양이 둥굴레와 비슷하기 때문에 구별하기가 쉽지 않다.
- 꽃이 밑으로 처지면서 피므로 난과식물로 착각하는 사람들이 많다.
- 어린순은 식용하고, 약으로 쓸 때는 주로 탕으로 하여 사용한다.
- 꽃말은 '당신을 따르겠습니다.' 이다.

# 족도리풀 Wild Ginger

- 분류 쥐방울덩굴과 > 족도리풀속 > 족도리풀
- 학명 *Asarum sieboldii* Miq.
- 특징 여러해살이풀로 15~20㎝ 정도 자란다. 잎은 보통 2개씩 나오고 긴 자루가 있으며 심장 모양으로 폭 5~10㎝이고 가장자리가 밋밋하다. 꽃은 4월에 피고, 근경이나 종자로 번식한다.

나무의 모습

암꽃

열매

## 해설 포인트

- 작고 동그란 꽃 모양이 마치 족두리를 닮아서 족도리풀이라고 한다. 근경은 마디가 많고 육질이고 매운맛이 있다.
- 금분초, 북세신, 세신, 한성세신이라는 본초명을 가지고 있다.
- 세신이라 부르는 뿌리를 한방에서 진해제, 거담제, 진통제, 이뇨제로 쓰고 감기 두통에 사용한다.
- 개족두리는 섬족두리풀, 섬세신이라고 하며 같은 용도로 쓰인다.
- 꽃말은 '모녀의 정'이다.

# 비교식물원

| | | |
|---|---|---|
| 복자기 | - | 복장나무 |
| 때죽나무 | - | 쪽동백나무 |
| 가막살나무 | - | 덜꿩나무 |
| 분꽃나 | - | 올분꽃나무 |
| | | 돈(Dawn) |
| 비자나무 | - | 개비자나무 |

비교식물원은 식물의 형태와 특성이 유사한 식물인 비자나무와 개비자나무, 잣나무와 섬잣나무, 산초나무와 초피나무 등의 닮은 나무를 비교할 수 있도록 전시한 원입니다.

# 복자기나무 Three-flowered Maple

- 분류 단풍나무과 > 단풍나무속 > 복자기나무
- 학명 *Acer triflorum* Kom.
- 특징 낙엽활엽교목으로 20m 정도 자란다. 3소엽으로 구성되고 소엽에는 2~3개의 큰 톱니가 있다. 뒷면 맥 위, 가장자리와 잎자루에 털이 있다. 꽃이 3개 달리며 꽃대에 갈색털이 있다. 5㎝ 정도의 시과열매가 달린다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 전국 각처에 분포하고 중부 이북에 주로 자생하고 있으며, 어릴 때는 음수지만 크면 양수로 바뀐다.
- 가을 단풍이 단풍나무류 중에서도 제일 곱고 진하여 세계적으로도 알려져 있는 조경수에 속한다.
- 목재는 치밀하고 무거우며 무늬가 아름다워 가구재나 무늬합판 등 고급용재로 사용된다.
- 꽃말은 '질투' 이다.

# 복장나무 Manchurian Maple

**분류** 단풍나무과 > 단풍나무속 > 복장나무

**학명** *Acer mandshuricum* Maxim.

**특징** 낙엽활엽소교목으로 10m 정도 자란다. 3소엽으로 구성되고 소엽에는 10~12개의 톱니가 있다. 잎자루는 붉은 빛이 돈다. 암수딴그루로 꽃은 3~5개씩 취산꽃차례로 달린다. 3㎝ 정도의 시과 열매는 털이 없다.

나무의 모습

잎·열매

꽃

## 해설 포인트

- 외형은 복자기와 거의 유사하나 수피가 복자기에 비해 매끈하다.
- 작은 잎은 규칙적인 톱니가 있고, 잎자루와 열매에 털이 없어 복자기와 구별된다.
- 목재는 치밀하고 무거워 건축재, 차량재, 선박재 등의 용재로 쓰인다.

# 때죽나무 Japanese Styrax

- 분류 때죽나무과 > 때죽나무속 > 때죽나무
- 학명 *Styrax japonicus* Siebold & Zucc.
- 특징 낙엽활엽소교목으로 10m 정도 자란다. 잎은 달걀형이고 끝이 뾰족하다. 잎겨드랑이에 종모양의 흰 꽃이 2~6개씩 달리고, 회백색의 핵과 열매는 9월에 성숙한다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 가을에 많이 매달린 열매가 회색으로 반질반질해서 마치 스님이 떼로 몰려 있는 것 같은 모습에 '떼중나무'로 부르다가 때죽나무가 된 것으로 짐작된다.
- 열매와 잎에 '에고사포닌'이란 마취성분이 고기잡이에 쓰였다. 이것을 찧어서 물속에 풀면 물고기가 순간적으로 기절하여 우스갯소리로 고기가 떼로 죽어 '떼죽나무'가 때죽나무로 되었다는 설도 있다.
- 꽃말은 '겸손'이다.

# 쪽동백나무 Fragrant Snowbell

**분류** 때죽나무과 > 때죽나무속 > 쪽동백나무

**학명** *Styrax obassia* Siebold & Zucc.

**특징** 낙엽활엽소교목으로 10m 정도 자란다. 2년생 가지는 얇은 껍질이 벗겨진다. 손바닥만한 원형 잎 뒷면은 흰빛이 돌며 별모양 털이 있다. 흰 꽃이 모여 핀 총상꽃차례는 아래로 처지고, 열매는 핵과이다.

나무의 모습

어린가지

꽃

## 해설 포인트

- 쪽동백나무는 동백나무와는 전혀 다르지만 동백기름 대신 쓸 수 있는 작은 열매가 열려서 쪽동백나무라고 이름을 지었다 한다.
- 때죽나무와 꽃, 열매, 나무껍질의 모양이 거의 같지만 잎의 모양과 꽃차례의 모양이 서로 다르다.
- 꽃말은 '잃어버린 추억을 찾아서' 이다.

# 가막살나무 Linden Viburnum

- 분 류 인동과 > 산분꽃나무속 > 가막살나무
- 학 명 *Viburnum dilatatum* Thunb.
- 특 징 낙엽활엽관목으로 3m 정도 자란다. 나무껍질 전체에 거친 털이 있다. 잎 양면에 별모양 털이 있고 뒷면에 샘이 있으며 턱잎이 없다. 복우상모양꽃차례로 꽃이 피고 열매는 붉은색으로 9~10월에 익는다.

나무의 모습

## 해설 포인트

- 내한성이 강하고 내공해성도 좋은 나무이다.
- 덜꿩나무와 거의 같은 시기에 꽃이 피고 모양새도 비슷해 구분이 거의 어렵다. 다만 가막살나무가 턱잎이 없고 잎 크기도 조금 큰 것이 다른 점이다.
- 꽃말은 '사랑은 죽음보다 강하다.' 이다.

# 덜꿩나무 Leather-leaf Viburnum

- 분 류 인동과 > 산분꽃나무속 > 덜꿩나무
- 학 명 *Viburnum erosum* Thunb.
- 특 징 낙엽활엽관목으로 2m 정도 자란다. 별모양 털이 어린가지와 잎 뒷면에 촘촘히 있다. 잎자루에 털과 턱잎이 있다. 복우상모양꽃차례가 1쌍의 잎이 달린 짧은 가지 끝에 달리며, 수술이 꽃부리보다 길다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 햇볕이 적당히 드는 숲 가장자리에 다른 잡초들과 어울려서 자란다. 내한성이 매우 강하고 양지와 음지 모두에서 잘 자라며 건조에도 하나 내공해성은 보통이다.
- 빨간 열매가 늦가을까지 달려 있어 배고픈 산새들의 먹이가 된다. 들꿩이 덜꿩나무 열매를 좋아해서 사람들이 '들꿩나무' 라고 부른 것이 덜꿩나무로 변했다는 설이 있다.
- 꽃말은 '주저' 이다.

# 분꽃나무 Korean Spice Viburnum

- 분 류 인동과 > 산분꽃나무속 > 분꽃나무
- 학 명 *Viburnum carlesii* Hemsl.
- 특 징 낙엽활엽관목으로 2m 정도 자란다. 어린가지와 잎 뒷면에 별모양 털이 밀생하고 잎 앞면에는 드문드문 있다. 연한 붉은색 꽃이 핀다. 핵과 열매는 검은색으로 익는다.

나무의 모습

### 해설 포인트

- 한자로 분화목(粉花木)이라고도 한다. 분꽃나무의 꽃봉오리는 본래 붉은 빛을 머금고 있는데 완전히 피면 흰색으로 변하며 향기가 매우 좋다.
- 꽃 모양이 초본류인 분꽃과 닮아서 분꽃나무가 되었다는 말이 있다.
- 꽃말은 '수줍음', '내성적', '소심' 이다.

# 올분꽃나무 돈

- 분 류 인동과 > 산분꽃나무속 > 올분꽃나무 돈
- 학 명 *Viburnum X Bodnantense 'Dawn'*
- 특 징 낙엽활엽관목으로 2m 정도 자란다. 4~5월에 잎과 동시에 꽃이 핀다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- '올'이라는 접두어는 이른(early)의 의미로, 다른 산분꽃나무속에 속한 수종들보다 약 한달 이상 빨리 꽃을 피우기 때문에 붙여진 것으로 보인다.
- 꽃이 예쁘고 향기가 좋아 외국에서는 아주 인기가 높은 수종으로 알려져 있다.

# 비자나무 Nutmeg Tree

- 분류 주목과 > 비자나무속 > 비자나무
- 학명 *Terreya nucifera* (L.) Siebold & Zucc.
- 특징 상록침엽교목으로 25m 정도 자란다. 선형 잎은 25㎜ 정도로 가죽질이다. 암수딴그루로 4월에 꽃이 핀다. 육질의 종의로 싸여 있는 핵과 열매는 자갈색으로 익는다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 음수로 어릴 때의 성장은 느린 편으로 개비자나무보다 종자가 크고 가종피가 녹색으로 익는 점이 특징이다. 어린 개체는 개비자나무와 유사하지만 잎이 보다 딱딱하며 잎 뒷면의 백색기공선 폭이 좁다.
- 용재가 탄력이 좋아 건축재, 가구재, 조각재로 쓰이며, 특히, 바둑판 재료로 고가에 판매된다.
- 꽃말은 '소중', '사랑스러운 미소' 이다.

# 개비자나무 Korean Plum-yem

**분류** 개비자나무과 > 개비자나무속 > 개비자나무

**학명** *Cephalotaxus koreana* Nakai

**특징** 상록침엽관목으로 3~6m 정도 자란다. 선형 잎은 중앙의 잎맥이 두드러지며 뒷면에 2줄의 기공조선이 있다. 암수딴그루로 3~4월에 녹색으로 핀다. 열매는 둥글고 붉은색으로 육질의 종의로 싸여 다음해 9월에 익는다.

나무의 모습

잎

열매

## 해설 포인트

- 한반도 특산식물로써 자생지 보호와 증식을 위한 노력이 필요한 수종이다.
- 일본과 중국 원산인 큰개비자나무와 비교하여 키가 작고 가지가 많이 갈라지는 특징이 있다.
- 꽃말은 '소중' '사랑스런 미소'이다.

# 모란, 작약, 수국원

수국
모란
작약

모란, 작약, 수국은 꽃이 크고 아름다워 관상용, 원예용으로 많이 개발되고 있습니다. 모란, 작약, 수국원은 다양하게 개량된 여러 종류의 모란과 작약, 수국을 전시한 원입니다.

# 수국 Bigleaf Hydrangea

- **분류** 범의귀과 > 수국속 > 수국
- **학명** *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.
- **특징** 낙엽활엽관목으로 1m 정도 자란다. 마주나는 잎은 두껍고 윤채가 있다. 꽃은 무성꽃이며, 꽃받침조각은 4~5개이고 꽃잎모양이며 하늘색 또는 연한 붉은색으로 변한다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 수국은 한자 이름인 '수구화(繡毬花)'에서 변한 것으로 보인다. 수구화는 비단으로 수를 놓은 것 같은 둥근 꽃이라는 의미이다.
- 중국 원산이나 일본인이 개량하는 과정에서 암술과 수술이 사라졌다고 한다.
- 산수국은 산에서 자라는 수국으로 산방꽃차례 둘레에 있는 꽃들의 꽃받침잎만 커지고 가운데에 있는 꽃들의 꽃받침은 커지지 않는다.
- 꽃말은 '성남', '변덕스러움'이다.

# 모란 Peony

- 분류 작약과 > 작약속 > 모란
- 학명 *Paeonia suffruticosa* Andrews
- 특징 낙엽활엽관목으로 2m 정도 자란다. 잎은 크게 3부분으로 나뉜 2회깃모양겹잎이다. 새로 나온 가지 끝에 큰 꽃이 한 송이씩 핀다. 골돌과 열매는 가죽질이고 털이 빽빽하다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 모란은 '꽃 중의 왕(花中之王)'이라는 뜻의 '화중지왕' 혹은 '나라에서 가장 빼어난 향'라는 의미로 '국색천향(國色天香)' 등으로 불렸다.
- 오래 전부터 꽃을 감상하거나 뿌리를 약으로 쓰기 위해 심었다.
- 김영랑의 시 〈모란이 피기까지는〉가 유명하다. '모란이 피기까지는 / 나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을 테요 / 찬란한 슬픔의 봄을'
- 꽃말은 '부귀', '왕자의 품격'이다.

# 작약 Peony Root

**분류** 작약과 > 작약속 > 작약

**학명** *Paeonia lactiflora* Pall.

**특징** 여러해살이풀로 50~80㎝ 정도 자란다. 근생엽은 1-2회 우상으로 갈라지며 윗부분의 것은 3개로 깊게 갈라지기도 한다. 꽃은 백색 또는 적색이며, 씨방은 3-5개로서 털이 없고 짧은 암술머리가 뒤로 젖혀진다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 작약은 겨울에 땅 위의 줄기가 모두 죽어버리고 뿌리만 살아 있는 여러해살이 풀이다.
- 모란은 '목단', 작약꽃은 '함박꽃'이라고도 한다.
- 잎은 따서 잘게 썬 다음 끓여서 염액을 추출해서 썼으며, 매엽제에 대한 반응도 좋아서 각각의 색이 뚜렷하다.
- 꽃말은 '수줍음'이다.

# 도시녹화 식물원지구

# 벽면녹화원

으름덩굴
등칡

도시 내 설치된 여러 형태의 벽면을 재현하고 벽면을 녹화 할 수 있는 덩굴식물을 식재한 벽면 녹화 견본원입니다.

# 으름덩굴 Five-leaved Akebia

- 분 류 : 으름덩굴과 > 으름덩굴속 > 으름덩굴
- 학 명 : *Akebia quinata* (Houtt.) Decne.
- 특 징 : 낙엽활엽덩굴식물로 덩굴 줄기는 5m 정도 자란다. 잎은 오래된 가지에서 모여 나며 손꼴겹잎이다. 암수딴꽃으로 4~5월에 피고 꽃잎이 없고 3개의 꽃받침잎이 있다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 바르셀로나 올림픽 당시 한국을 대표하는 수종으로 식재되었던 나무이다.
- 꽃꽂이 소재 등 관상용으로 적합하며, 과육은 식용으로 쓰인다.
- 연산군은 금방 딴 으름을 승정원에 내리며 "승지들은 맛을 보고 이것으로 농담시를 지어 바치라"고 했다. 달콤 쌉쌀한 맛일까?
- 꽃말은 '재능'이다.

# 등칡 Manchurian Pipevine

- **분류** 쥐방울덩굴과 > 쥐방울덩굴속 > 등칡
- **학명** *Aristolochia manshuriensis* Kom.
- **특징** 낙엽활엽덩굴식물로 10m 정도로 자란다. 잎은 둥글며 첨두 심장저이다. 꽃은 암수딴그루로 U자형으로 꼬부라지며 열매는 삭과로 긴 타원형이다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 잎 모양이 칡과 비슷하게 생긴 목본성 식물이므로 "등칡"이라고 하나 "등나무"와는 전혀 다른 식물이다.
- 성질이 강건하므로 재배작물로 쉽게 이용할 수 있고 맹아력이 강하다.
- 등칡의 줄기는 이뇨작용에 효과가 있어 한약재로 쓰인다.
- 꽃말은 '가무(歌舞)' 이다.

# 계류 · 연못원

쇠뜨기
노랑어리연꽃
창포

자연계류를 활용한 계류와 연못을 조성하여 계류와 연못에서 볼 수 있는 버드나무, 오리나무, 물봉선 등의 수생식물, 습지성 식물을 배치한 원입니다.

# 쇠뜨기 Horsetail

- **분류** 속새과 > 속새속 > 쇠뜨기
- **학명** *Equisetum arvense* L.
- **특징** 여러해살이 양치식물로 30~40㎝로 자란다. 갈색 생식줄기는 이른 봄에 나온 후에 뒤늦게 녹색의 영양줄기가 나온다. 포자로 번식하거나 땅속줄기를 길게 뻗어 번식한다.

나무의 모습

영양줄기

포자낭수

**해설 포인트**

- 고사리보다 더 원시적인 식물이다.
- 소가 잘 뜯어먹는다는 데서 '쇠뜨기'라는 우리말 이름이 생겼으며, 생식줄기 끝에 달리는 포자낭수가 뱀 머리를 닮아서 '뱀밥'이라 부르기도 한다.
- 근래에는 신비의 약초라 하여, 과학적 효능이 입증되어 건강식품으로 새롭게 각광받고 있다.

# 노랑어리연꽃 Water Fringe Yellow Floatingheart

- **분류** 조름나물과 > 어리연속 > 노랑어리연꽃
- **학명** *Nymphoides peltate* (J.G.Gmelin) Kuntze
- **특징** 다년생 수초로 원줄기가 물속에서 길게 옆으로 뻗으며 자란다. 긴 잎자루로 물 위에 뜨는 잎의 뒷면은 갈색을 띤 보라색이 돈다. 7~9월에 피는 노란 꽃은 오이꽃과 비슷하다.

## 나무의 모습

### 해설 포인트

- 어리연꽃의 한 종류인데, 꽃의 형태가 약간 다르다. 어리연꽃은 하얀색이며 가운데 부분이 노랗고, 꽃잎 주변에는 하얀 털이 잔뜩 나 있다. 꽃의 크기는 노랑어리연꽃이 어리연꽃보다 2배 정도 크다.
- 연꽃보다 재배가 용이하므로 연못이나 늪지 등 다양한 수면녹화에 이용한다.
- 꽃말은 '요정', '물의요정', '수면의 요정' 이다.

# 창포 Calamus, Sweet Flag

- **분류** 천남성과 > 창포속 > 창포
- **학명** *Acorus calamus* L.
- **특징** 여러해살이풀로 잎의 길이가 70㎝ 정도이다. 잎은 근경 끝에서 모여나기하며 주맥이 뚜렷하다. 6~7월에 피는 꽃은 중앙부에 5㎝ 정도 이삭꽃차례로 비스듬히 옆으로 달린다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 특이한 향을 내는 식물로 입욕제, 화장품, 비누 등에 이용한다.
- 단오절에는 창포 뿌리를 삶은 물에 머리를 감고, 뿌리를 깎아서 비녀를 만들어 꽂는 풍습이 있었다.
- 예전에는 민가 주위에서도 쉽게 볼 수 있었으나 경지정리 및 제초제의 사용으로 희귀 식물이 되었다.
- 꽃말은 '경의', '신비한 사람' 이다.

# 암석원

홍자단

섬향나무

골과 바위로 고산지대의 모습을 재현하고 건조하고 척박한 고산환경에 적응한 식물을 모아둔 전시원입니다.

# 홍자단 Rock Cotoneaster

- **분류** 장미과 > 홍자단속 > 홍자단
- **학명** *Cotoneaster horizontalis* Decne.
- **특징** 반상록 또는 낙엽활엽관목으로 1m 정도 자란다. 5~6월에 분홍색의 꽃이 피고 8~9월에 적자색의 열매가 많이 열린다.

나무의 모습

꽃·잎

열매

## 해설 포인트

- 원산지에서는 해발 2000~3500m산지에서 자생한다. 가지는 많이 분지하며 옆으로 뻗어 자라는 성질이 있다.
- 분재로 이용되며 세계의 온대에 약 50여종이 나며 대만에서는 2종이 난다.
- 꽃말은 '통일'이다.

# 섬향나무 Procumbens Chinese Juniper

- **분류** 측백나무과 > 향나무속 > 섬향나무
- **학명** *Juniperus chinensis* var. *procumbens* (Siebold) Endl.
- **특징** 상록침엽관목으로 줄기 길이가 1~2m 정도로 땅을 기며 자란다. 줄기가 1년지는 녹색, 2년지는 적갈색이다. 잎 표면은 희고 주맥보다 백선이 넓고 6줄로 배열된다.

나무의 모습

### 해설 포인트

- 우리나라 남쪽 해안지대에 주로 분포한다.
- 침엽과 인엽을 모두 지니고 있으나 대부분이 인엽으로 이루어져 있어 질감이 매우 부드럽다.
- 눈향나무와 비슷하지만 해안산인 것이 다르다. 눈향나무에 비해 가지는 굵고 바늘잎은 찌르며 보통 3돌려나기 한다.
- 꽃말은 '숨겨진 진실' 이다.

# 자연생태원

신나무
자주받침꽃
꾸지뽕나무
가죽나무
말오줌나무
가침박달

도시에 도입 가능한 다양한 생태정원의 형태를 제시한 원으로 목재더미, 돌더미 등을 설치하여 야생조류, 나비, 잠자리, 개구리 등의 서식처 모델을 제시한 원입니다.

# 신나무 Amur Maple

- 분류 단풍나무과 > 단풍나무속 > 신나무
- 학명 *Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm.
- 특징 낙엽활엽소교목으로 8m 정도 자란다. 잎은 밑에서 3갈래로 갈라지고 가장자리에 불규칙한 결각과 날카로운 거치가 있다. 꽃은 황백색으로 핀다. 시과 열매는 거의 평행하거나 혹은 서로 합쳐진다.

## 나무의 모습

잎·열매

꽃

### 해설 포인트

- 단풍의 붉음이 진하여 옛사람들이 신나무에 붙인 이름은 '때깔 나는 나무'란 뜻의 '색목(色木)'이다. 옛 한글 발음으로 '싣나모'라고 하다가 오늘날 신나무가 되었다.
- 잎을 삶아서 우린 물을 회흑색의 물감으로 사용했다. 주로 스님들의 옷인 장삼을 비롯한 법복을 물들이는 데 쓰였다.
- 꽃말은 '변치 않는 귀여움'이다.

# 자주받침꽃 Sweet Shrub

- **분 류** 받침꽃과 > 자주받침꽃속 > 자주받침꽃
- **학 명** *Calycanthus fertilis* Walter
- **특 징** 낙엽활엽관목으로 2~3m 정도 자란다. 마주나는 잎은 난상 타원형이며 꽃은 녹자색 또는 적갈색이고 지름 3.5~5㎝로서 넓고 향기가 강하다. 열매는 거꿀달걀모양이다.

나무의 모습

꽃

잎

## 해설 포인트

- 북아메리카 원산이며, 우리나라에는 1957년 아놀드수목원으로부터 도입했다.
- 꽃이 자주색이며 꽃받침과 꽃잎의 구별이 어려워 자주받침꽃이라고 한다. 향기 좋은 잎, 나무, 뿌리는 포푸리에 사용된다.
- 꽃에서 추출하는 에센셜오일은 고급 향수원료로 사용된다고 한다.
- 꽃말은 '자애'이다.

# 꾸지뽕나무 Tricuspid Cudrania

- 분류 뽕나무과 > 꾸지뽕나무속 > 꾸지뽕나무
- 학명 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bureau ex Lavallee
- 특징 낙엽활엽관목으로 2~8m 정도 자란다. 잎은 어긋나기로 갈라지는 것과 가장자리가 밋밋하고 달걀모양인 것도 있다. 암수딴그루로 꽃은 5~6월에 피며 노란색을 띤다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 줄기에는 가지가 변한 억세고 긴 가시가 있다.
- 뽕나무와 쓰임새가 비슷하나 박달나무와 맞먹을 정도로 단단하다. 뽕나무보다 더 단단하다는 뜻으로 '굳이뽕나무'가 변해 꾸지뽕나무가 되었다.
- 나무껍질과 뿌리는 말려서 약으로 썼으며, 〈동의보감〉에서는 몸이 허하여 귀 먹은 것과 학질을 낫게 한다고 한다.
- 꽃말은 '지혜'이다.

# 가죽나무 Tree of Heaven

- **분류** 소태나무과 > 가죽나무속 > 가죽나무
- **학명** *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle
- **특징** 낙엽활엽교목으로 20m 정도 자란다. 홀수깃꼴겹잎이다. 암수딴그루고 원뿔 모양꽃차례는 가지 끝에 달린다. 연한 적갈색의 시과 열매는 3-5개씩 가을부터 봄까지 달려 있다.

나무의 모습

잎

꽃

## 해설 포인트

- 가죽나무와 참죽나무는 과(科)가 다르나 생김새가 아주 비슷하다. 어린순을 나물로 먹는 참죽나무가 아닌 먹을 수 없는 가짜 참죽나무라는 뜻에서 가죽나무라고 하며 가중나무라고도 한다.
- 가죽나무 잎에 아주 큰 톱니가 2~3개 있다. 이 톱니의 끝에 딱딱한 알맹이가 만져지는데 약간 고약한 냄새의 근원지이다.
- 꽃말은 '누명' 이다.

# 말오줌나무 a Red-berried Elder

- 분류 인동과 > 딱총나무속 > 말오줌나무
- 학명 *Sambucus sieboldiana* var. *pendula* (Nakai) T.B.Lee
- 특징 낙엽활엽관목으로 4~5m 정도 자란다. 홀수깃모양겹잎이고 가장자리 톱니가 뾰족하며 꽃은 6월에 가지 끝에 달려 처진다. 열매는 둥글며 짙은 붉은색이고 7~8월에 익는다.

나무의 모습

해설 포인트

- 울릉도 특산종으로 말이 오줌을 잘 누지 못할 때 줄기와 가지를 달여서 먹었더니 오줌을 잘 누게 돼서 얻은 이름이다.
- 열매가 황색으로 성숙한 것을 '노랑말오줌나무' 라고 하고, 울릉도의 저동계곡과 경남 거제의 저도에서 자란다.
- 꽃말은 '열심' 이다.

# 가침박달 Common Pearlbush

- **분류** 장미과 > 가침박달속 > 가침박달
- **학명** *Exochorda serratifolia* S.Moore
- **특징** 낙엽활엽관목으로 1~5m 정도 자란다. 잎은 끝이 뾰족하며 윗부분에 톱니가 있다. 꽃은 5월 초순경 가지 끝에 3~6개씩 모여 달린다. 열매는 깃대 봉 모양으로 성숙한다.

나무의 모습

꽃

열매

## 해설 포인트

- 씨방의 특징인 '감치기'와 박달나무처럼 단단한 재질을 가졌다는 의미를 합쳐 '감치기 박달'이 되었다가 가침박달이 된 것으로 보인다.
- 이름에 박달이 들어간 여러 종류의 나무 중 가침박달은 중부 이북에서 자라는 흔치 않는 나무로써 산림청 보존 우선순위 105번째 식물이다.
- 꽃말은 '청순', '순결', '숨겨진 아름다움'이다.

## 참고문헌


김성환, 2016. 화살표 식물 도감. 자연과생태: 서울.

김진석, 김태영, 2012. 한국의 나무. 돌베개: 파주.

박상진, 2014. 궁궐의 우리 나무. 눌와: 서울.

박상진, 2011. 우리 나무의 세계 1. 김영사: 파주.

박상진, 2011. 우리 나무의 세계 2. 김영사: 파주.

송기엽, 윤주복, 2003. 야생화 쉽게 찾기. 진선출판사: 서울.

윤주복, 2007. 겨울나무 쉽게 찾기. 진선출판사: 서울.

윤주복, 2010. 나뭇잎 도감. 진선출판사: 서울.

윤주복, 2014. 나무 쉽게 찾기. 진선출판사: 서울.

임경빈, 2006. 나무백과(1). 서진인쇄사: 서울.

하늘매발톱, 2006. 옛이야기를 품은 나무. 가교출판: 서울.

국립수목원, 2016. 국가생물종지식정보시스템. http://www.nature.go.kr.

환경부, 2011. 국립생물자원관. https://species.nibr.go.kr/index.do

한국과학기술정보연구원, 2005. 자생식물데이터베이스. http://minsok.ndsl.kr.

## ㄱㄴㄷ순으로 찾아보기


ㄱ

가막살나무 166
가시오갈피 55
가죽나무 193
가침박달 195
갈매나무 138
갈참나무 100
감나무 59
감태나무 144
개나리 74
개머루 105
개비자나무 171
개암나무 33
개잎갈나무 131
계수나무 60
고로쇠나무 110
곰솔 8
구슬꽃나무 62
굴참나무 30
귀룽나무 91
길마가지나무 150
까마귀밥나무 141
까마귀베개 139
깽깽이풀 155
꾸지뽕나무 192

ㄴ

낙우송 124
노각나무 29
노랑어리연꽃 184
노린재나무 143
느티나무 67

ㄷ

다래 69
다릅나무 24
닥나무 111
당단풍나무 53
당매자나무 71
대팻집나무 140
덜꿩나무 167
도사물나무 98
등칡 181
때죽나무 164

ㄹ

리기다소나무 9

ㅁ

만리화 42
만주고로쇠 51
말오줌나무 194
말오줌때 61
망개나무 58
매발톱나무 20
매화말발도리 149
메타세쿼이아 63
명자나무 118
모과나무 22
모란 174
목련 72
무궁화 81
문배 92
물박달나무 152
물오리나무 89
미선나무 75

ㅂ

박달나무 153
박쥐나무 47
박태기나무 120
방크스소나무 10
배롱나무 28
백당나무 87
백송 11

백합나무 41
버드나무 79
벚나무 34
벽오동 21
병아리꽃나무 43
보리수나무 35
복수초 156
복자기 162
복장나무 163
분꽃나무 168
붉나무 82
붉은칠엽수 103
비목나무 145
비술나무 146
비자나무 170
뻐꾹나리 157

ㅅ

사람주나무 19
사스래나무 56
사철나무 64
산뽕나무 80
산사나무 23
산수유 36
산옥매 44
산초나무 15
삼색병꽃나무 88
삼지닥나무 25
상산 16
상수리나무 113
서부해당 93
섬괴불나무 127
섬댕강나무 128
섬향나무 188
소나무 12
소사나무 129
솔송나무 13
솜대 39
쇠뜨기 183
수국 173
수수꽃다리 76
수양버들 126
순비기나무 125
시무나무 26
신나무 190

ㅇ

안개나무 48
얼레지 158
영춘화 116
오동나무 114
올괴불나무 151
올분꽃나무 돈 169
왕대 37
윤판나물 159
으름덩굴 180
은단풍 52
은행나무 85
음나무 27
이나무 86
이대 38
이팝나무 77
일본목련 73

ㅈ

자귀나무 104
자작나무 90
자주받침꽃 191
작약 175
잣나무 132
전나무 133
조각자나무 31
조팝나무 94
족도리풀 160
종비나무 134
주목 112
주엽나무 32
중국단풍 70

중국복자기 18
쥐똥나무 117
진달래 119
쪽동백나무 165
찔레꽃 95

ㅊ

참느릅나무 147
참빗살나무 65
창포 185
채진목 45
철쭉 99
청미래덩굴 78
초피나무 83
측백나무 135
층층나무 102

ㅋ

콩배나무 96

ㅌ

탱자나무 84

ㅍ

팥꽃나무 46
팽나무 68
포포나무 54
풍게나무 148
풍년화 49
피나무 106

ㅎ

합다리나무 142
해당화 17
향나무 101
헛개나무 109
홍자단 187
화백 136
화살나무 66
회양목 107
흰말채나무 50
히어리 97

2020년 이야기가 있는 **인천수목원**

• 발행일 : 2020년 12월
• 편　집 : 산림복지전문업 더숲
• 발행처 : 인천광역시 인천대공원사업소
• 인천수목원 2020-01 비매품