

2021 - 2022 절기

어르신 인플루엔자 예방접종 안내문



만 65세부터 인플루엔자 예방접종 국가지원

10월 12일부터 가까운 동네 의료기관에서 인플루엔자 예방접종을 할 수 있습니다.

• 어르신 인플루엔자 예방접종 지원사업 •

- **지원대상** 만 65세 이상 어르신 (1956.12.31. 이전 출생자)
- **접종기관** 지정의료기관 및 보건소
※ 예방접종도우미 누리집 또는 앱에서 확인가능 (보건소는 방문 전 확인필수)
- **지원기간**

만 75세 이상 (1946.12.31. 이전 출생자)	2021.10.12.(화) ~ 2022.2.28.(월)
만 70~74세 (1947.1.1. ~ 1951.12.31. 출생자)	2021.10.18.(월) ~ 2022.2.28.(월)
만 65~69세 (1952.1.1. ~ 1956.12.31. 출생자)	2021.10.21.(목) ~ 2022.2.28.(월)
- **지원내용** 인플루엔자 4가 백신 예방접종 1회

이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- ✓ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은
예방접종 시 주의가 필요합니다.
- ✓ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

예방접종 도우미 바로가기



안드로이드용 QR코드



아이폰용 QR코드



예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ✓ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- ✓ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ✓ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 접종 당일은 반나절 이상 충분히 쉬고, 음주나 지나친 운동은 피합니다.
- ✓ 접종 후 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

● 예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



보호자와
대상자 모두
반드시 마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙
준수



대상자, 보호자는
코로나19 증상이 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 의료기관에서
15~30분 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

인플루엔자 예방접종 후 이상반응

● 예방접종 후 발생 가능한 이상반응


- ✓ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ✓ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



부어오름, 통증



발열



무력감



근육통



두통

● 예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.